

Dimensioni human dhe Mishngrënësit e mëdhenj

Sot në botë flitet dhe ka studime mbi mishngrënësit e mëdhenj. Karnivorë të mëdhenj konsiderohen Ariu (*Ursus arctos*), Ujku (*Canis lupus*), Rrëqebulli (*Lynx lynx*), të pranishëm edhe në Shqipëri.



Lynx lynx (Rrëqebulli)

e mishngrënësve të mëdhenj në Shqipëri ne kemi vendosur të studiojmë në kuadër të një projekti, pozicionin tonë si qenie njerëzore në lidhje me mishngrënësit e mëdhenj.

A janë ata armiq dëmtues apo thjesht specie, të cilat ndoshta kërkojnë më tepër vëmendje nga ne...

Në këtë projekt bashkohen Organizatat ndërkombëtare Grupi Specialist i Maceve të Egra të Botës (IUCN SSC/Cat Specialist Group), Organiqata Zvicerane për Menaxhimin e Mishngrënësve të Mëdhenj (KORA), Fondi Evropian për Trashëgiminë Natyrore (Euronatur) dhe Instituti Norvegjez për Kërkimet Mjedisore (NINA), dhe shoqatat implementuese të projektit; Shoqata përmbytje e Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA), Shoqata përmbytje e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë (ASPBM) dhe Shoqata Ekologjike Maqedonase (MES), ku vëmendja kryesore i është drejtuar rrëqebullit të Ballkanit (mishngrënës i madh më i rrezikuar; përmbytje mendohet të ketë vetëm 25 individë).

Ndër objektivat më kryesore të këtij bashkëpunimi përmendim studimin dhe monitorimin e species, pozicionin e njerëzve ndaj mishngrënësve të mëdhenj, shpalljen e zonave të mbrojtura etj.

Duke u bazuar mbi këto objektiva duket qartë se dimensioni human luan një rol të konsiderueshëm në menaxhimin e Jetës së egër.

E gjitha kjo përfshin jo vetëm të kuptuarit e biologjisë dhe habitatit të species, por edhe qëndrimin publik ndaj tyre e njohuritë mbi speciet dhe gjithashtu qëndrimin ndaj një menaxhim të mundshëm drejtuar species.

Dimensioni human përmbytje menaxhimin e jetës së egër është veçanërisht i rëndësishëm përmbytje të kuptuar projektimin dhe implementimin e një plani menaxhimi përmbytje mishngrënësit e mëdhenj,

të cilët shpesh herë shkaktojnë konflikte midis publikut të gjërë. Kështu menaxhim i Karnivorëve të mëdhenj është shpesh më tepër çështje politiko – sociale sesa biologjike.

Këto aspekte humane është e nevojshme të kuptohen nëpërmjet një procesi shkencor dhe objektiv përmbytje konservimin e mishngrënësve të mëdhenj në Shqipëri.

Dimensioni human fokusohet në nivelin e njohurive publike, qëndrimin dhe aktivitetin ndaj mishngrënësve dhe habitateve shoqëruar të tyre.

Një nga synimet që tenton të përbushë çështja e dimensionit human është identifikimi i llojit të konfliktit ndërmjet mishngrënësve të mëdhenj dhe humanëve. Në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të hartojmë planet e zgjidhjes së këtyre konflikteve.

Për këtë ne kemi plotësuar pyetësorë, të cilët përbajnë pjesën e pyetjeve përmbytje këtë konflikteve. Janë përgjedhur gjithsej 66 fshatra të Shqipërisë, ku këto specie janë të pranishëm dhe deri tani janë vizituar 32 (pjesa tjetër do të vizitohet gjatë 2 viteve të tjera pune në projekt).

Në këto fshatra (pjesa kufitare me Maqedoninë) janë intervistuar 70 persona (gjuetarë, bari, punonjës pyjesh, individë me njohuri të mira përmbytjezon).

Nga pyetësorët është parë se ka pasur dy lloje kryesore dëmtimesh nga Mishngrënësit e mëdhenj; dëme në njerëz dhe dëme në mbjella, pemë frutore, bagëti, koshere bletësh etj.

Dëmet në njerëz kanë qenë të pakta dhe përbjënjë 22% të fshatrave të vizituara; të tillë ka pasur në Sopot, Stravaraj, Fushë-Stude, Peshkopi / Dibër (më 2005 nga ujku), Selishtë (nga ariu dhe ujku), Kala e Dodës (më 2001 dhe 2005 nga ariu), Rapdisht- Bellovë (më 1999- 2000 nga ariu). Megjithatë këto raste që përbjënjë një pakicë, të intervistuarit pohojnë se sulme të tillë kanë ndodhur në rrëthana të caktuara dhe se mishngrënësit e mëdhenj nuk përbjënjë një rrezik të mundshëm përmbytje.

Dëmet në mbjella, pemë frutore, bagëti, koshere bletësh etj. ka pasur në 78% të fshatrave të vizituara deri tani. Këto kanë ndodhur kryesisht në fshatrat Steblevë, Qarrishtë, Vithkuq, Gërmjen, Vermosh, Vukël, Selcë, Goricë e madhe, Goricë e vogël, Voskopojë, Rraca, Gjergjë, Selishtë, Kala e Dodës etj.

Në pamje të parë duket se karnivorët e mëdhenj shkaktojnë dëme të mëdha, por në fakt dëme të tillë konsiderohen si të evitueshëm, në mënyrë që të ruajmë ekilibra të shëndoshë natyrore. Gjithashtu qëndrimi negativ i njerëzve ndaj natyrës është paraprijës i të gjitha këtyre dukurive.

Pjetjes se si mbrohen njerëzit nga mishngrënësit e mëdhenj shumica e të intervistuarve iu përgjigji se mbrojtja kryesore ishin armët. Atëherë duket qartë se më të rrezikshëm jemi ne në vend që të ishim mbrojtësit kryesorë të kafshëve....

Mishngrënësit e mëdhenj mbrohen me ligj (Konventa e Ruajtjes së Jetës së Egër dhe Habitante natyrore Evropiane- Konventa e Bernës), por mesa duket kjo mbrojtje tek ne ekziston vetëm teorikisht...

Tjetër faktor që dëshmon ndikimin negativ të njerëzve ndaj mishngrënësve të mëdhenj është gjuetia e paligjshme, e cila bashkë me faktorë të tjera si degradimi i habitatit, pakësimi i ushqimit (sërisht ndikimi i njeriut) bëjnë të mundur pakësimin e specieve dhe jo vetëm kaq, por këto të fundit mund të cilësohen edhe si shkaku kryesor i dëmtimeve që kanë ndodhur nga karnivorët e mëdhenj.

Nga studimi i deritanishëm në intervalin kohor 1991 – 2006 janë vrapë 33 Arinj; në intervalin kohor 1980 – 2005 janë vrapë 12 Rrëqebulli dhe në intervalin kohor 1999 – 2006 janë vrapë 38 ujqërë (nga këtë 19 individë janë vrapë vetëm në 2006);

Siq shihet ne po shkatërrojmë hap pas hapi jetën e egër dhe po çoriointojmë çdo ekilibër ekzistues

Përse të mos u krijojmë mishngrënësve të mëdhenj habitatin e tyre të përshtatshëm në vend që të shtojmë shifrat marramendëse të vrashës së tyre... A nuk do të ishte më mirë që të kishim një natyrë të pasur se sa një natyrë të varfër dhe pa jetë...

Ne nuk na mbetet gjë tjetër veçse në 2 vitet e ardhshme në kuadër të këtij projekti të punojmë përmbytje menaxhim të jetës së egër, në mënyrë që ne dëme mishngrënësit e mëdhenj të bashkëzistojmë në harmoni të plotë...

Erjola Keçi - (ASPBM)



canis- lupus



Ursus arctos (Ariu i murrmë)